


**Características y Afecciones
en las que todos los métodos
entran dentro de las categorías 1 y 2 (se pueden utilizar)**

Alto riesgo de VIH	Edad: 18-39	Paludismo
Anemias, entre ellas la depanocitosis y la talasemia	Endiometrosis	Tras un aborto sin (sepsis)
Antecedentes de cirugía pélvica, incluida la casárea	Epilepsia	Trastornos tiroideos
Antecedentes de diabetes gestacional	Esquistosomiasis (bilharziasis)	Tratamientos con antibióticos (excluida la rifampicinao rifabutina)
Antecedentes de Embarazo ectópico	Hemorragias menstruales irregulares, intensas o prolongadas	Tuberculosis (aunque en caso de tuberculosis genital no se puede utilizar el DIU)
Antecedentes de hipertención durante el embarazo	Hepatitis vírica (portadora o crónica)	Tumores ováricos benignos, incluidos los quistes
Cirrosis leve	Intervención quirúrgica sin inmovilización	Valbulopátia cardiaca no complicada
Depresión	Mastopatias: antecedentes familiares, mastopátias benignas y tumoraciones no diagnosticadas	Venas varicosas
Dismenorrea		

Nota acerca de las afecciones

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Puede insrtarse < 48 h o > 4 semanas | O AOC, AIC, AMPD y EN-NET = 3-4 en caso de diabetes complicada o de duración > 20 años. |
| B 2 si no atenido partos posteriormente. | P AOC = 3. AIC = 2. |
| C U otras formas de cervicitis purulenta. | Q Fenitoína, carbamazepina, barbituratos, primidona, topiramato, oxcabazepina., Para lamotrigina AOCs/ACIs = 3. Otros metodos = 1 |
| D Si aparece durante el uso del DIU, se puede seguir utilizando durante el tratamiento. | R DIU = 3 si el estado clínico no es bueno. |
| E Sia hay alto riesgo de ITS o VIH, aconsejar el uso de preservativos. | S No se puede utilizar el DIU si hay distorsión de la cavidad uterina. |
| F 3 si hay gran probabilidad de exposicion a gonorrea o clamidiasis. | T 2 si la edad es > 45 años. |
| G 2 si estaá en tartamiento antiretrovíricos; excepto ARVs reforzados con ritonavir = 3. | U Si la terapia anticoagulante está establecida = 2. |
| H 3 si tiene SIDA y no va bien con el tratamiento antirrerovírico. | V AMPD = 1; EN-NET = 2 |
| I AOC = 4 si hay gran consumo de tabaco.
AIC = si hay ligero consumo de tabaco. | W Categoría 1 aplica tambien a multiaridad |
| J Si no se puede medir la tensión arterial y no tiene antecedentes conocidos de hipertensión, se pueden utilizar todos los métodos. | X Mujeres que tienen un bebe menor a seis meses por sesaria |
| K Se aplica la misma categoría a la hipertensión controlad. | Y La categoría 1 aplica si la mujer tuvo 4 sangrados menstruales seguidos |
| L Los factores de riesgo incluyen la edad avanzada, el tabaquismo, la diabetes y la hipertensión.. | Z En el caso de cumplirse amenorrea y lactancia exclusiva |
| M Para comprobar si la migraña se acompaña de aura, pregunte "¿Ve una mancha luminosa antes antes de que aparezca el dolor de cabeza?" | AA Categoría 4 en el caso que los medicamentos usados son incompatibles con la lactancia materna |
| N AOC y AIC =2 en caso de migraña sin aura y edad < 35 años. AOC y AIC = 3 en caso de migraña sin aura y edad > 35Años. | BB Categoría 4 en presencia de sangrado Vaginal. |
| | CC Categoría 4 si afecta ciclo menstrual |
| | DD Categoría 4causadas por desordenes metabolicos hormonales |



Disco OMS para determinar elegibilidad médica de métodos anticonceptivos
 Criterios médicos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el método anticonceptivo inicial. (Actualización 2008).



Estado Plurinacional de Bolivia
 Ministerio de Salud y Deportes